

Recto

10 mm

10 mm

5 mm

20 mm

250 mm

5 mm

148 mm

**Písomná informácia pre používateľa**

**Venoruton Forte**  
500 mg tablety  
O-(beta-hydroxyetyl)-  
-rutozidy

**Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.**

- Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
- Ak sa do 2 týždňov nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

**V tejto písomnej informácii sa dozviete:**

1. Čo je Venoruton Forte a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Venoruton Forte
3. Ako užívať Venoruton Forte
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Venoruton Forte
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

**1. Čo je Venoruton Forte a na čo sa používa**

Venoruton Forte obsahuje O-(beta-hydroxyetyl)-rutozidy, ktoré patria do skupiny liekov s ochranným vplyvom na cievy (nazývané systémové vazoprotektíva). Venoruton Forte stabilizuje cievnu stenu, čo vedie k zníženiu jej priepustnosti a k následnému zmenšeniu opuchov.

**Ako pôsobí Venoruton Forte**  
Úľava pri opuchu členka v dôsledku chronickej žilovej nedostatočnosti.

U pacientov s varixami (krčhovými žilami) a ďalšími ochoreniami žíl dolných končatín dochádza k nadmernému úniku látok cez steny kapilár, čo vedie k opuchu členkov. Venoruton Forte znižuje opuch a prináša úľavu od jeho sprievodných príznakov, ako sú páliivý pocit, unavené ťažké, opuchnuté bolestivé a „nepokojné“ nohy, parestézie (pocit pichania alebo mravčenia) a kŕče.

Odporúča sa, aby pacienti pri chronickej žilovej nedostatočnosti používali aj elastickú bandáž (zvyčajne sťahovacie pančuchy). Dokázalo sa, že Venoruton Forte v týchto prípadoch prináša ďalšie zvýraznenie účinku.

V prípade hemoroidov vyvolá Venoruton Forte v sliznici konečníka zníženie opuchu a zmierni príznaky, ako sú svrbenie, krvácanie a mokvanie.

Venoruton pôsobí na najmenšie krvné cievy (kapiláry) tým, že znižuje únik vody a ďalších látok cez ich steny. Zníženie kapilárnej priepustnosti v sietnici oka

diabetických pacientov (diabetická retinopatia). Zníženie opuchu v prípade lymfedému (opuch v dôsledku zhoršeného prietoku lymfy).

**2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Venoruton Forte**

**Neužívajte Venoruton Forte:**

- ak ste alergický na O-(beta-hydroxyetyl)-rutozidy alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6 a na konci časti 2).

**Upozornenia a opatrenia**  
Predtým ako začnete užívať Venoruton Forte, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik, ak:

- máte opuchy dolných končatín v dôsledku ochorenia srdca, obličiek alebo pečene; Venoruton Forte v takom prípade neužívajte, pretože v týchto indikáciách nie je účinný.

**Deti a dospelávajúci**  
Venoruton Forte sa neodporúča podávať deťom do 18 rokov.

**Iné lieky a Venoruton Forte**  
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, vrátane výživových doplnkov a liekov bez lekárskeho predpisu.

**Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť**  
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

V súlade so všeobecne akceptovanými bezpečnostnými požiadavkami neužívajte Venoruton forte 500 mg počas prvých troch mesiacov tehotenstva.

**Vedenie vozidiel a obsluha strojov**  
Venoruton Forte nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

U pacientov užívajúcich tento liek boli v zriedkavých prípadoch hlásené únava a závraty. Ak ste unavený alebo máte pocit závratu, nevedte vozidlo a neobsluhujte stroje.

**3. Ako užívať Venoruton Forte**

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste ničím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnik.

Starostlivo postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Chronická žilová nedostatočnosť a jej komplikácie  
Odporúčané dávkovanie: Počiatočná dávka je 1 tableta dvakrát denne.

Toto dávkovanie dodržujte do úplného odoznenia príznakov a opuchov. Úľava od príznakov sa zvyčajne dostaví v priebehu 2 týždňov.

Liečba môže pokračovať v rovnakej dávke ako udržiavacia terapia alebo pri minimálnej udržiavacej dávke 500 mg až 600 mg Venorotonu denne, čo zodpovedá dávke 1-krát denne 1 tableta Venorotonu forte 500 mg.

Po úplnom vymiznutí opuchu a ďalších príznakov chronickej žilovej nedostatočnosti sa môže liečba

